


การรับรองกันระหว่างหน่วยงานที่ต้องการได้ยิน



- ความปรึกษาแพทย์ หรือถ้าเป็นไปได้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหูด้วยเฉพาะ

2. “ไม่วรรณดอยาหารือรักษาหูของโดยไม่ปรึกษาแพทย์”

3. อย่าแผลหูร้อยส้างหูโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะไม่ควรให้ห่างตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไปโดยเด็ดขาด และไม่ควรใช้ของแข็งที่มีปลายแหลมหรือมีคมแคงๆ

4. สำหรับครรภ์ที่กำลังตั้งครรภ์และคนไข้อาการแพ้หูมาก ไม่ควรซื้อยา รับประทานเอง เพศภายนอกและบานในนิมิตผลต่อเด็กในครรภ์ ทำให้เด็กพิการได้

5. “ไม่วรรณเข้าไปในบริเวณหูมีเสียงดังมาก” เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณสนามบิน หรือบริเวณที่มีการจุดประทัด ระเบิด พลุหรือยิงปืน เป็นต้น เพราะเสียงดังเหล่านี้จะทำลายกระดูกหูได้ในกรณีที่หัวใจกำบังเครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก เช่น เครื่องยนต์ เครื่องหอยฝ้า เครื่องไส้ไม้ หรือเครื่องจักรในโรงงานผลิตและโรงงาน “

 - ยารักษา malariae (ควนิน) หรือยาแก้ปวด เช่น เอ.พี.ซี. ยาไฟริน ถ้าจำเป็นต้องรับประทานและรักษาหูอื้อ ให้หยุดยาทันที
 - ยาฉีดประเทยาปฏิรูปหูต่างๆ เช่น สเต็ปเพตเมซิค หรือยารักษาหูอื้อในครรภ์ เมื่องอก โรคไตอาจทำให้ประสาหูเสื่อมได้
 - 7. ถ้าพานมือจากการเดินเครื่องมือ แรงเรียบแบบตัวหมุน หรือบ้านหมุน ควรรีบพบแพทย์
 - 8. สำหรับครอบครัวที่มีบุตรหลานวาก หรือหูอื้อแต่ก็เกิด ควรไปพบนักโสัตสมัสดิวิทยา และนำบุตรคนนั้นไปตรวจหากได้ยินเพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดกับบุตรคนอีก ทำ sama รายงานตรวจพบตนเองว่า “ถ้าเป็นหูไม่โดยชอบธรรมต้องไปรักษาในโรงพยาบาล





- จุกรกในโรงเรียนแห่งนี้ต้องไม่หอบ
แก้ว ๆ ฯลฯ ควรให้เครื่องป้องกัน
เสียงดูดหู เพื่อป้องกันประสาทหู



ถูกทำลาย
หัวใจไม่ติดชอบคำรามต่อไปนี้
□ ทำนัมป์หนาในการพังทาง
โทรศัพท์
□ ทำน้ำเสียงเสียลงทาง

ນູ່ເປັນອົງວຍກະທີສໍາຄັນແລະນີ້ມີຄ່າຕ່ອງຫຼົງຈະອອງເຮົາ
ມາກ ນູ່ຂ່າຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍືນ ໄດ້ເຮັດວຽກ ໄດ້ເຫັນ ໄດ້ຮູບຈົງ
ອັນຕົນວາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແລະຢັ້ງມີຄຸນຄາຕ່ອງຫຼົງຫາອະເການນັ້ນ
ປະກາວ ໂຮງໂດຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼຸ່ມເລຳວາຈໍາທໍາໄໝກີດຄວາມ
ຜົນປາດີທາງການໄດ້ຍືນໄດ້ ຄວາມຜົນປາດີທາງການໄດ້ຍືນ
ອາຈຸດກິດກັນບຸກຄົດໃຫ້ໄດ້ ແນວ່າຈະໄປເປັນອັນຕົນກາຍເຖິງ
ຫຼົງວັດ ແຕ່ກີດທໍາໃຫ້ບຸກຄົດນີ້ສັກຫຼຸດໜີຈິດ ລຳຄານໄຈທີ່ພົງ
ຄົນອັນພົດໄນ້ເຖິງ ຫຼືມີຜົນລາກະບະປ່ອລິຫຼືໃຈແລະອາຮັນມີ

1. ทักษะที่มีอยู่ในหน้ากากยอกบัน